

**Készítette : Fátyol László**



**Angol:** Ostrich

**Francia:** Autruche d'Afrique

**Német:** Strauss

**Román:** Strutul

**Szerb:** Afrički noj

**Rendszertan:**

Struccalakúak rendje/Struccfélék családja

**Elterjedés, élőhely:**

Afrika és Ázsia száraz, félsivatagos területei

**Természetvédelmi helyzete:**

Nem veszélyeztetett

**Testtömeg:**

90-130 kg

**Testhossz:**

200 cm

**Marmagasság:**

200-220 cm

**Táplálkozás:**

Fűfélék, magok, virágok, de ragadozók által meghagyott maradékok is.

**Szaporodás:**

40 napos kelési idő után 15-60 fióka kel ki

**Élettartam:**

40-50 év

**Szociális viselkedés:**  
5-50 egyedből álló csoportokban él.

**A legnagyobb**

A Földünkön ma élő madarak közül a strucc a legnagyobb termetű. Néhány, valamivel kisebb rokonához hasonlóan röpképtelen, futni azonban nagyon gyorsan képes, akár 70km/h-ás sebességgel is. Ebben nemcsak az segíti, hogy hosszú lábai rendkívül izmosak, hanem az is, hogy csak két, lábujja van. Ezek azonban vaskosak, különösen a belső, így nagyobb felületről, erőteljesebben tud elrugaszkodni. A strucc féltékenyen és agresszíven védelmezi fészket, és félelmetes rúgásokkal tartja távol a betolakodókat. A csibék fészekhagyók. Életük első öt hó-napjában havi 30 cm-t nőnek. Az ivarérettséget 3 éves korukban érik el.

A mondás, mely szerint: "Homokba dugja a fejét, mint a strucc!" nem valós alapokon nyugszik. Ha ugyanis a strucc ezt tenné, nem tudna levegőt venni. Valójában amikor, pihen vagy kotlik, elfekteti

hosszú nyakát a talajon. Így messziről csak száraz bokornak vagy kupacnak tűnik, vagyis ezzel álcázza magát.

Laza tollai kedvelt öltözékkiegészítők már régóta, s ezért a 18. századra csaknem kiirtották. Háziasított példányok tartásával azonban a vadon élők - kivéve a szír struccot, melyet az 1940-es évekre kiirtottak - megmenekültek a kihalástól.